2 Impfbücher
Wolf.

CHARITÉ
UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN

**Impfplan: bitte zu jedem Termin vorzeigen**

**Ärztin/Arzt:** _____ MK

**Institut für internationale Gesundheit, Charité Campus Virchow-Klinikum,**
**Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin**
Mo – Fr: 08.00-19.00 Uhr und Sa: 11.00-15.00 Uhr **Südring 2**

| | Impfung | Letzte Impfung | Nächste Impfung | | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | Tetanus* | 9 | | | Ab 2 Monaten: GI: 3 Impfungen erforderlich<br>Auffrischung: Eine Impfung alle 10 Jahre |
| ✓ | Diphtherie* | 4 | | | Ab 2 Monaten: GI: 3 Impfungen erforderlich<br>Auffrischung: Eine Impfung alle 10 Jahre |
| ✓ | Pertussis* | 4 | | | Alle Erwachsenen sollen bei der nächsten fälligen Td-Impfung einmalig Pertussis mit auffrischen (Tdap oder TdapIPV). Ausnahme: Schwangere (1x im 3. bzw. 2. Trimenon) und enge Kontakte Neugeborener (alle10 J.) |
| ✓ | Poliomyelitis | 22 | ☐ international | | Ab 2 Monaten: GI 3 Impfungen + eine Auffrischung<br>Bei Reisen in bestimmte Länder mit Poliorisiko: letzte Impfung max. 10 Jahre, in einigen Fällen max. 1 Jahr alt. |
| ✓ | Masern-Mumps-Röteln (MMR) Varizellen (V) | 17 | | | Ab (9) 12 Monaten: GI: 2 Impfungen; Impfschutz lebenslang<br>Alle nach 1970 geborenen Erwachsenen sollen eine MMR-Impfung erhalten, wenn bisher keine oder als Kind nur eine Impfung erfolgt ist oder der Masern-Impfstatus unklar ist. |
| ✓ | Gelbfieber | | | | Ab 9 Monaten: GI: 1 Impfung; Gültig nach 10 Tagen, nur in anerkannten Gelbfieber-Impfstellen; 4 Wochen Abstand zur MMR- und Varizellen-Impfung. Impfschutz: 2. Impfung nach 10 Jahren (bei Schwangeren, Immungeschwächten, Kindern früher), dann lebenslanger Schutz |
| X | Typhus | | | | i. m. ab 2 Jahren: 1 Injektion; Impfschutz 1-3 Jahre<br>oral ab 5 Jahren: 1 Kapsel alle 2 Tage nüchtern, mind. 1 Std. vor dem Essen, insg. 3 Kapseln. Kühl lagern (2-8°C)! Impfschutz: 1-3 Jahre |
| | Hepatitis A* | | 1)<br>2) | ☐<br>☐ | Ab 12 Monaten: GI: Monat 0, 6-12 (18), je nach Impfstoff<br>Impfschutz: mind. 10 Jahre |
| ✓ | Hepatitis B* | | 1)<br>2)<br>3) | ☐<br>☐<br>☐ | Ab Geburt; GI: Monat 0, 1, 6<br>Schnellschema ab 18 Jahren: Tag 0, 7, 21, 365<br>Nach erfolgreicher Impfung (Anti-HBs ≥ 100 IE/l) sind im Allgemeinen keine weiteren Auffrischimpfungen erforderlich. |
| ✓ | Hepatitis A+B* | 2x 1<br>1x 2<br>1x 17 | 1)<br>2)<br>3) | ☐<br>☐<br>☐ | Ab 2 Monaten: GI: Monat 0, 1, 6<br>Schnellschema ab 18 Jahren: Tag 0, 7, 21, 365<br>Impfschutz: nach erfolgreicher Impfung mind. 10 Jahre |
| | Meningokokken | | ☐ ACWY ☐ B | | Ab 6 Wochen (Nimenrix®): GI: 1-3 Impfungen (je nach Alter)<br>Auffrischung: bei anhaltendem Risiko nach 10 Jahren<br>Pflichtimpfung bei Pilgerreisen nach Mekka |
| | Japanische Enzephalitis* | | 1)<br>2) | ☐<br>☐ | Ab 2 Monaten: GI: Monat 0, 1 + Auffrischung (Monat 12-24)<br>Schnellschema 18-65 Jahren: Woche 0, 1, + Auffrischung (Monat 12-24)<br>Impfschutz: 10 Jahre nach GI + 1. Auffrischung |
| X | Tollwut | 3x Schnellsch. Booster | 1)<br>2)<br>3) | ☐<br>☐<br>☐ | Ab Geburt: GI: Tag 0, 7, 21 o. 28 / WHO GI: Tag 0, 7 (off-label-use)<br>Auffrischung: laut WHO führt eine GI mit 2 Impfungen zu einer jahrzehnte- bis lebenslangen Boosterungsfähigkeit<br>Bei tollwutverdächtigem Tierkontakt erneute Impfung an Tag 0 und 3! |
| | Cholera | | 1)<br>2) | | Dukoral ®: Ab 2 Jahren: GI: 2 Schluckimpfungen im Abstand von 1-6 Wochen nüchtern, 2 Std. vor und nach der Einnahme nicht Essen oder Trinken. Kühl lagern (2-8°C)! Kein Schutz vor Reisediarrhoe! |
| | FSME* | | 1)<br>2)<br>3) | ☐<br>☐<br>☐ | Ab 1 Jahr: GI: Monat 0, 1, 6-12 (je nach Impfstoff)<br>Schnellschemata: z.B. Tag 0, 14, Monat 9-12 (Auffrischung anpassen!)<br>Impfschutz: 3-5 Jahre (altersabhängig) |
| | Influenza Saisonal | Effuela 21/22 zahlreich | ☐ SD ☐ HD | | Ab 6 Monaten möglich: Jährlich 1 Impfung<br>Sinnvoll für alle Reisende, Personen ab 60 Jahren und Personen mit chron. Grundleiden (Diabetes, Immundefizienz, etc.) sowie Pflegende |
| ✓ | Pneumokokken | P-13 (19)<br>P-23 (21 | | | P23: ab 60 Jahren oder ab 16 Jahren mit chr. Grunderkrankung<br>Sequenziell: erst P13, dann nach 6-12 Monate P23 (bei Immundefekt, Liquorfistel, Cochlea-Implantat und mit 2-15 Jahre bei chr. Grundleiden)<br>Wiederholung: Bei erhöhtem Risiko frühestens nach 6 Jahren (nur P23) |
| | HPV | | 1)<br>2)<br>3) | ☐<br>☐<br>☐ | Ab 9-14 Jahren: GI: Monat 0, 6-12<br>Ab 15 Jahren: GI: Monat 0, 2, 6 (0, 1, 4-12)<br>Auffrischung: derzeit noch unklar |
| | Herpes Zoster | | 1)<br>2) | ☐<br>☐ | Ab 60 Jahren und Personen mit chron. Grundleiden ab (18) 50 Jahren<br>GI: Monat 0, 2 (ggf. Monat 1-6)<br>Auffrischung: derzeit noch keine Daten |
| ✓ | COVID 19 | 5x | | | STIKO: Abstand zu Lebendimpfungen mindestens 2 Wochen davor und danach. |

Die Empfehlungen basieren auf Ihren Angaben unter Berücksichtigung von Reiseziel, Reiseart, Reisedauer und vorhandenem Impfschutz.
GI= Grundimmunisierung *Kinderimpfstoff vorhanden